

CONSEILS POST- OPÉRATOIRES




VOUS VENEZ D'ÊTRE OPÉRÉ...

l'observation d'un certain nombre de précautions
favorise une cicatrisation rapide et diminue les risques
de complications

APRÈS L'INTERVENTION



SUIVRE UNIQUEMENT LES
PRESCRIPTIONS DE
L'ORDONNANCE PENDANT
TOUTE LA DURÉE INDIQUÉE



AVANT LE RÉVEIL DE L'ANESTHÉSIE
ET S'IL APPARAÎT UNE DOULEUR
POST-OPÉRATOIRE, PRENDRE LES
ANTALGIQUES PRESCRITS À LA
DOSE RECOMMANDÉE



POUR ÉVITER **L'OEDEME**, PLACER
DES GLACONS DANS UN SACHET
EN PLASTIQUE ET L'APPLIQUER
SUR LA PEAU AU NIVEAU DE LA
ZONE OPEREE PENDANT 1/4
D'HEURE.

RÉAPPLIQUER TOUTES LES HEURES
DANS LA JOURNEE QUI SUIT
L'INTERVENTION



UNE COLORATION ROUGEATRE DE
LA SALIVE EST NORMALE

SI UN **SAIGNEMENT** SURVIENT DE
MANIÈRE DURABLE APPUYER
FERMEMENT SUR UNE COMPRESSE
PLIEE EN QUATRE SUR LA REGION
CONCERNEE PENDANT 15 MINUTES

EN CAS DE MANIFESTATION
ANORMALE TELEPHONER AU
CABINET DENTAIRE OU AU 15



L'APPARITION D'UN **HÉMATOME**
AUTOUR DE LA ZONE
D'INTERVENTION EST POSSIBLE



VOUS POUVEZ POURSUIVRE VOS
ACTIVITES COURANTES.

EVITEZ CEPENDANT LES
EXERCICES TROP VIOLENT

UNE LEGERE FATIGUE PENDANT 1
A 3 JOURS EST NORMALE



EVITEZ A TOUT PRIX **LE TABAC**
PENDANT LES 7 PREMIERS JOURS



ALIMENTATION

APRES L INTERVENTION...

ALIMENTATION MOLLE OU SEMI
MOLLE ET TIEDE OU FROIDE

PAS DE BOISSON ALCOOLISEE NI
DE PLATS EPICES OU ACIDE

NE PAS MASTIQUER SUR LA
REGION OPEREE



HYGIÈNE

APRES CHAQUE REPAS,
CONTINUEZ A BROSSER LES DENTS
COMME D'HABITUDE SAUF AU
NIVEAU DE LA REGION OPEREE
OU NOUS VOUS AVONS PRESCRIT
UNE BROSSE SPECIALE

RINCER AVEC UN BAIN DE
BOUCHE 24 HEURES APRES
L'INTERVENTION



BONNE SEMAINE

